

НАТТОКИНАЗА – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ФОРМА ВЫПУСКА

Капсулы 2000FU по 90 шт в упаковке.

СОСТАВ

Экстракт сои, целлюлоза, мальтодекстрин, стеариновая кислота, стеарат магния, диоксид кремния.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Наттокиназа предупреждает заболевания способствует излечению уже существующих расстройств, работая по следующим направлениям:

- улучшает состояние сердца и сосудов,
- предотвращая инсульты и инфаркты
- нормализует кровообращение при тромбозе глубоких вен и варикозном расширении способствует нормализации кровяного давления
- эффективен при восстановительной терапии организма после инсульта
- борется с атеросклерозом
- устраняет причины стенокардии
- предотвращает проявления геморроя

ПОКАЗАНИЯ

- высокий уровень холестерина (прямая угроза инсультов и инфарктов);
- ишемическая болезнь сердца и головного мозга;
- гипертоническая болезнь;
- период восстановления после инсульта и сердечного приступа;
- сахарный диабет, особенно в стадии декомпрессии (осложнений);
- возрастное снижение памяти и интеллекта (у 60% людей старше 60 лет старческое слабоумие связано с тромбозами (закупорками) сосудов головного мозга).;
- мышечная усталость, боль в ногах после короткой пешей дистанции, что характерно для людей в прединсультном состоянии;
- частое онемение или покалывание в кистях рук и стопах ног;

- в случаях, когда порезы, раны, трещины на стопах ног долго не заживают(особенно при сахарном диабете);
- онкологические заболевания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

По 1 капсуле 1 раз в день во время еды 6-8 недель непрерывно. При необходимости возможны повторные курсы в течение года.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость. Приём лекарственных препаратов, воздействующих на свёртываемость крови и артериальное давление, беременность, период лактации.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Аллергические реакции.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Прежде чем принимать Наттокиназа необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом при беременности, кормлении грудью, а также в случае приема лекарств, которые воздействуют на свёртывание крови или артериальное давление (аспирин, кумадин (варфарин), витамина К, гепарина, диуретиков, ингибиторов ангиотензин-конвертирующего энзима, бета-блокаторов).

СРОК ГОДНОСТИ

3 года.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В сухом, прохладном, недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°C.

**САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.**