

ПЕНТАСА ТАБЛЕТКИ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА И УПАКОВКА

Таблетки пролонгированного действия, по 500 мг № 100 (10x10) в блистерах.

СОСТАВ

1 таблетка содержит 500 мг месалазина.

ПОКАЗАНИЯ

Пентаса - Препарат с противовоспалительным действием, применяемый для лечения болезни Крона и НЯК. Обладает местным противовоспалительным действием. Уменьшает образование лейкотриенов и цитокининов, нейтрализует свободные радикалы, ингибирует хемотаксис лейкоцитов. Обладает антибактериальным действием в отношении кишечной палочки и некоторых кокков (проявляется в толстой кишке). Оказывает антиоксидантное действие. Снижает риск рецидива при болезни Крона, особенно у пациентов с илеитом с большой длительностью заболевания.

Показания к применению: неспецифический язвенный колит; болезнь Крона.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Внутрь, не разжевывая, по возможности проглатывая целиком, доза подбирается индивидуально. Взрослым при обострении язвенного колита или болезни Крона — обычно до 4 г/сутки в несколько приемов; поддерживающая доза — 2 г/сутки в несколько приемов при язвенном колите и 4 г/сутки в несколько приемов при болезни Крона; детям старше 2 лет — обычно 20–30 мг/кг/сутки в несколько приемов.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

При передозировке возможны тошнота, рвота, гастралгия, слабость, сонливость. Лечение симптоматическое.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИИ ГРУДЬЮ

Пентаса при беременности и в период кормления грудью назначают только в тех случаях, когда положительный эффект превосходит риск развития возможных побочных действий. При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

При применении препарата Пентаса могут наблюдаться ощущение дискомфорта в области живота, тошнота, рвота, головная боль, диарея, кожная сыпь в виде крапивницы или экземы; очень редко — боль в мышцах и суставах, временное выпадение волос, нарушения функции печени и почек, перикардит, миокардит,

панкреатит, изменения формулы крови (лейкопения, гранулоцитопения, тромбоцитопения, анемия).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат Пентаса противопоказан при гиперчувствительности к месалазину, любому другому компоненту препарата или салицилатам; заболеваниях печени и/или почечной недостаточности; заболеваниях системы крови; в возрасте до 2 лет, при пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки, кровотечении, дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, в период беременности и кормления грудью.

ОСОБЕННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В начале и в течение всего курса лечения Пентаса следует регулярно контролировать состав периферической крови, уровень мочевины, креатинина.

В случае выраженных патологических изменений состава крови (повышенная кровоточивость, подкожные кровоизлияния, боль в горле, лихорадка), развития перикардита, миокардита и синдрома острой непереносимости препарат необходимо отменить.

Возможно окрашивание мочи и слезной жидкости в желто-оранжевый цвет, прокрашивание мягких контактных линз.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Срок годности - 3 года.

КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА

По рецепту.

**САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.**